

Tópicos: *reparametrização, comprimento de uma curva, comprimento de arco*. **Sugestão:** Desenhe, sempre que possível, as curvas e a animação da trajetória do ponto em ambiente computacional para ampliar o entendimento do exercício para além da habilidade algébrica.

1. Desenhe em ambiente computacional, utilizando sistemas de computação simbólica, incluindo a animação do vetor tangente percorrendo as seguintes parametrizações da parábola $\alpha(t) = (t, t^2)$ e $\gamma(t) = (t^3, t^6)$. Mostre que α é curva regular e γ não é regular. Qual seria a função naturalmente candidata a ser uma reparametrização entre as duas parametrizações? Porque falha?
2. Mostre que as curvas regulares $\alpha(t) = (t, e^t)$, $t \in \mathbb{R}$ e $\beta(s) = (\log(s), s)$, $s \in (0, \infty)$ têm o mesmo traço.
3. Calcule o comprimento de arco das seguintes curvas:
 - a. $\alpha(t) = (3 \cosh 2t, 3 \sinh 2t, 6t)$, $t \in [0, \pi]$.
 - b. Catenária: $\gamma(t) = (t, \cosh(t))$, a partir do ponto $(0, 1)$.
4. *Mudanças de parâmetro:*
 - a. Demonstrar que $s(\theta) = \frac{\theta^2}{\theta^2 + 1}$ é uma mudança de parâmetro diferenciável que tranforma o intervalo $(0, \infty)$ no intervalo $(0, 1)$.
 - b. Mostrar que a função $\lambda : (-1, 1) \rightarrow (-\infty, +\infty)$ definida por $\lambda(t) := \tan(\pi t/2)$ é uma mudança de parâmetro.
 - c. Provar que qualquer curva pode ser reparametrizada de forma tal que o domínio da reparametrização seja um intervalo de extremos 0 e 1.
5. Provar que a curva

$$\gamma(t) = \left(2t, \frac{2}{1+t^2} \right)$$

com $t > 0$ é regular e é uma reparametrização de

$$\alpha(t) = \left(\frac{2 \cos t}{1 + \sin t}, 1 + \sin t \right), \quad t \in (-\pi/2, \pi/2).$$

6. Seja $\alpha(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \cos t + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t, \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t, \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \right)$. Reparametrizar α pelo comprimento de arco.
7. Mostre que, se todas as retas tangentes a uma curva regular passam por um mesmo ponto $P \in \mathbb{R}^2$, então seu traço está contido em uma reta.
8. Mostre que, se todas as retas normais a uma curva regular passam por um mesmo ponto $P \in \mathbb{R}^2$, então seu traço está contido em um círculo.