

Monitoria EDP

28/10/2021

Convolução


$$L: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$$

$f: A \rightarrow B$ é uma função. Usualmente, $A = B = \mathbb{R}$.




Convolução: $(L f)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(u) h(x-u) du$

Exemplo:



$S(t) =$ fumaça no ar em t de um fósforo.



↳ acendemos o fósforo

$f(t) = \#$ fósforos acesos em t .

Quanta fumaça ainda resta? Suponha que acendemos um fósforo a cada minuto:

$$S^{\text{Total}}(t) = \underbrace{f(t)}_{\# \text{ fósforos em t fumaça gerada}} \cdot S(0) + \underbrace{f(t-1)}_{\text{fósforos que estavam acesos 1 min atrás...}} \cdot S(1) + \dots$$

Autovalor e autovetor.

Seja L_h a convolução por h ,

$$(L_h f)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(u) h(x-u) du.$$

Quais os autovetores dessa transformação, isto é, qual função g satisfaz $\forall x$,

$$(L_h g)(x) = \lambda g(x),$$

para $\lambda \in \mathbb{R}$.

Tomando $w \in \mathbb{R}$, $e_w(x) := e^{2\pi w x}$ é autovetor de L_h independente de h , isto é,

$$\int_{\mathbb{R}} e_w(u) h(x-u) du = \lambda_w e_w(x), \quad \forall x;$$

em que $\lambda_w = \hat{h}(w) := \int_{\mathbb{R}} h(u) e^{-2\pi w u} du$

Podemos escrever

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \boxed{\hat{f}(w)} e^{2\pi w x} dw$$

↑ Coeficientes de f escrita na base $\{e_w(x)\}_{w \in \mathbb{R}}$.

→ Dimensão infinita

Acontece que $\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-2\pi i \omega u} du$ é a transformada de Fourier.

Ou seja, a Transformada de Fourier é o conjunto de coeficientes da função f na base dos autovetores da convolução.

Existem formas diferentes de derivar a Transformada de Fourier que chegam em fórmulas distintas, mas a ideia é a mesma, a mais de constante

Quando f é periódica com período 2π e contínua por partes, podemos definir a transformada de Fourier como a sequência $(\hat{f}(k))_{k \in \mathbb{Z}}$, em que

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \exp(-ikx) dx$$

A série de Fourier é $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{ikx}$

De forma geral, $c_n = \frac{1}{T} \hat{f}\left(\frac{n}{T}\right)$, T é o período de f .

Questões da Lista

1) A série de uma função é'

Uma extensão do
pedago em verde
para $P \neq 2\pi$ \leftarrow
qualquer

$$\sum_{k=-\infty}^{k=\infty} \hat{f}(w) e^{i \frac{2\pi}{P} wx}$$

$$\hat{f}(w) = \frac{1}{P} \int_{-P/2}^{P/2} f(x) e^{-i \frac{2\pi}{P} wx} dx$$

Para $a, b, c, P = 2\pi,$
 $d, P = 2$

No caso da a),

$$\cos(wx) - i \sin(wx).$$

$$\hat{a}(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(5x) e^{-iwx} dx$$


\rightarrow Prove

Note que $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(px) \cos(qx) = 0$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(px) \sin(qx) = 0 \Leftrightarrow p \neq q.$$

Isso facilita as contas.

2) Considere $n=4$



À direita

À esquerda

$$u_t(x,t) = u(x+\Delta x, t) - 2u(x,t) + u(x-\Delta x, t)$$

Como são 4 pontos:

$$\begin{bmatrix} u_t(1,t) \\ u_t(2,t) \\ u_t(3,t) \\ u_t(4,t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(1,t) \\ u(2,t) \\ u(3,t) \\ u(4,t) \end{bmatrix}$$

↳ Pesquisar por
Circulant Matrix

Quem são os autovetores dessa matriz?

A Matriz de Fourier Discreta!

Ela pode ser facilmente computada a partir do método Fast Fourier Transform (FFT).

Seja C matriz circulante,

$$C = F D F^{-1} = F \frac{D}{n} \bar{F}$$

$$Cx = F \frac{D}{n} \bar{F} x = \text{fft} \left(\frac{D}{n} i \text{fft}(x) \right),$$

em que $D = \text{fft}(C_1)$.

3 e 4) Usar propriedade da derivada da transformada Fourier:

$$\hat{f}'(\omega) = i\omega \hat{f}(\omega)$$

Logo $\hat{u}_x(\omega) = i\omega \hat{u}(\omega)$.

Em particular, $\hat{u}_t(\omega, t) + c \hat{u}_x(\omega, t) = 0$,
mas $\hat{u}_x(\omega, t) = i\omega \hat{u}(\omega, t)$ e logo

$$\hat{u}_t(\omega, t) = -c i \omega \hat{u}(\omega, t)$$

↳ EDO 1ª ordem
com variável \hat{u}

Após encontrar $\hat{u}(\omega, t)$, usar a transformada inversa.

Computacionais

- 1) Aplicar fft no sinal e pegar as intensidades das frequências. Pesquisar a técnica Harmonic Product Spectrum para deixar mais preciso a escolha da nota.
- 2) Usar a ideia $u_t = -c L u$ que tem solução

$$\begin{aligned} u(t) &= e^{-ctL} u_0 \\ &= F e^{-ctD} F^{-1} u_0 \\ &= \text{fft}(e^{-ct\omega} \text{ifft}(u_0)) \end{aligned}$$